

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鼻炎用内服薬

第2類医薬品

鼻炎カプセル「キュキュ」S

鼻炎カプセル「キュキュ」Sは、血管収縮成分のフェニレフリン塩酸塩をはじめ、抗ヒスタミン成分のd-クロルフェニラミンマレイン酸塩のほか、グリチルリチン酸、無水カフェインを配合しています。アレルギー性鼻炎や急性鼻炎などによるくしゃみ、鼻みずなどの諸症状の緩和に効果をあらわします。



使用上の注意

☒ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難、むくみ
(6) 次の診断を受けた人。

緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 泌尿器 | 排尿困難 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--------------------|---|
| 偽アルドステロン症 ミオパシー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
□のかわき、眠気
4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）



【用法・用量】

次の量を、毎食後なるべく30分以内に水又は白湯にて服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人（15歳以上） | 2カプセル | 3回 |
| 7歳以上15歳未満 | 1カプセル | 3回 |
| 7歳未満 | 服用しないでください | |

（用法・用量に関する注意）

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

（PTPシートの取り出し図）



【成分・分量】

1日量（6カプセル）中

| 成 分 | 分 量 |
|-------------------|------|
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 6mg |
| フェニレフリン塩酸塩 | 20mg |
| グリチルリチン酸 | 45mg |
| 無水カフェイン | 90mg |

添加物として、トウモロコシデンブン、乳糖水和物、リン酸水素Ca水和物、タルク、ステアリン酸Mg、ラウリル硫酸Na、ゼラチンを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わります）

(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。



■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貴堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貴 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）