

2013年6月改訂  
(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## 胃腸鎮痛鎮痙薬

第2類医薬品

## 胃腸反魂丹



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなる場合があります。)



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)高齢者。  
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5)次の症状のある人。  
排尿困難  
(6)次の診断を受けた人。  
心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
□のかわき、便秘、目のかすみ
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

裏面もよくお読みください。



## 【効能・効果】

胃痛、腹痛、さしこみ（せんつう 疝痛、しゃく 癩）、胃酸過多、胸やけ

## 【用法・用量】

成人（15歳以上）……………1回30丸 11歳以上15歳未満 ……1回20丸  
8歳以上11歳未満 ……1回15丸 5歳以上8歳未満……………1回10丸  
3歳以上5歳未満……………1回7丸

1日2回を限度とし、水又は白湯にて服用してください。

服用間隔は4時間以上おいてください。

●3歳未満は服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

## 【成分・分量】

1日量（2包60丸）中

エンメイソウ ……………900mg ゲンチアナ ……………200mg  
オウバク ……………1200mg モッコウ ……………100mg  
オウレン ……………500mg ロートエキス……………40mg

添加物として、炭酸Ca、寒梅粉、サリチル酸、カルメロースNa、タルク、アラビアゴム、薬用炭、三二酸化鉄を含有する。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

## ■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記に  
お願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣貫堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）