

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

胃腸薬

第3類医薬品

広貫堂複方熊膽丸

広貫堂複方熊膽丸は、ユウタン、動物胆（牛胆）、ニンジン、センブリの4つの種類の和漢生薬を配合し、胃弱、飲み過ぎ、はきけ、二日酔・悪酔のむかつきなどに効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき）、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐


【用法・用量】

次の量を、食後に水又は白湯にて服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	10丸	3回
11歳以上15歳未満	7丸	
8歳以上11歳未満	5丸	
5歳以上8歳未満	4丸	
3歳以上5歳未満	3丸	
3歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。
- 丸薬の取り出し方
右図のように切ってください。
丸薬がスムーズに出ます。



裏面もよくお読みください。

【成分・分量】


1日量（3包30丸）中

成分	分量
ユウタン	18mg
動物胆（牛胆）	100mg
ニンジン末	100mg
センブリ末	40mg

添加物として、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、アラビアゴム、サリチル酸、薬用炭、セラックを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。



【用法・用量】

【用法・用量】
 1日3回、食後、お茶や水で飲む。小児は年齢に応じ、お茶や水で飲む。1歳未満の小児は飲ませない。1歳以上2歳未満の小児は、お茶や水で飲む。2歳以上6歳未満の小児は、お茶や水で飲む。6歳以上12歳未満の小児は、お茶や水で飲む。12歳以上の小児は、お茶や水で飲む。

【注意・お問い合わせ先】

【注意・お問い合わせ先】
 本品は、お茶や水で飲む。小児は年齢に応じ、お茶や水で飲む。1歳未満の小児は飲ませない。1歳以上2歳未満の小児は、お茶や水で飲む。2歳以上6歳未満の小児は、お茶や水で飲む。6歳以上12歳未満の小児は、お茶や水で飲む。12歳以上の小児は、お茶や水で飲む。

（お茶や水で飲む）

お茶や水で飲む。

お茶や水で飲む。小児は年齢に応じ、お茶や水で飲む。1歳未満の小児は飲ませない。1歳以上2歳未満の小児は、お茶や水で飲む。2歳以上6歳未満の小児は、お茶や水で飲む。6歳以上12歳未満の小児は、お茶や水で飲む。12歳以上の小児は、お茶や水で飲む。

お茶や水で飲む。

お茶や水で飲む。

お茶や水で飲む。

お茶や水で飲む。

**■お問い合わせ先**

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお問い合わせ先
 上げます。

株式会社 廣買堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元

**株式会社 廣買堂**

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）