

令和元年8月1日
株式会社廣貫堂
信頼性保証室

ジヒドロコデインリン酸塩配合製品の使用上の注意の改訂について

この度、令和元年7月9日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知（薬生薬審発0709第9号）に基づき、ジヒドロコデインリン酸塩を配合する製品について、使用上の注意を改訂することになりました。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

■改訂箇所及び改訂内容

改訂箇所	改訂内容(下線部追記)
してはいけないこと	次の人は服用しないこと <u>12歳未満の小児。</u>
用法・用量に関連する注意	以下の内容の削除 12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先すること。

■対象製品

かぜ薬

- ・新カンポーエース
- ・ネオ真治ゴールド錠
- ・ハイカゼLカプセル
- ・ハイカゼ顆粒L
- ・ネオ真治ゴールドカプセル
- ・ハイカゼα錠（注）
- ・ハイカゼ顆粒α
- ・新カドリンカプセルG（注）

鎮咳去痰薬

- ・散剤せきどめ「廣貫堂」
- ・せきどめカプセル「廣貫堂」

（注）ハイカゼα錠及び新カドリンカプセルGにつきましては、製造中止のため、今回の使用上の注意改訂も含めて、今後添付文書等の改訂は実施致しません。

* 対象製品の改訂後の添付文書内容をご覧になりたい方は、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」のホームページ内の「一般用医薬品・要指導医薬品情報検索ページ（<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/otcSearch/>）」において、製品名を検索し、最新添付文書情報を閲覧くださいますよう、お願い申し上げます。

※2018年12月改訂

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鎮咳去痰薬

第2類医薬品

せきどめカプセル「廣貫堂」

せきどめカプセル「廣貫堂」は、ジヒドロコデインリン酸塩及びノスカピンの2種類の中樞性鎮咳成分、気管支を広げ呼吸を楽にしてくれる気管支拡張成分のdl-メチルエフェドリン塩酸塩、抗ヒスタミン成分のクロルフェニラミンマレイン酸塩のほか生薬のゴオウ、カンゾウを配合した鎮咳去痰薬です。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気等があらわれることがあります。）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
4. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

裏面もよくお読みください。



【効能・効果】

せき、たん

※【用法・用量】

次の量を食後に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2カプセル	3回
12歳以上15歳未満	1カプセル	
12歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)カプセルの取り出し方
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を（PTPシートの取り出し図）指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

**【成分・分量】**

1日量（6カプセル）中

成 分	分 量
ジヒドロコデインリン酸塩	20mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
ノスカピン	45mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	9mg
無水カフェイン	120mg
ゴオウ	2.7mg
カンゾウエキス末	96mg (カンゾウ672mgに相当)

添加物として、セルロース、乳糖水和物、メチルセルロース、赤色3号、黄色5号、ラウリル硫酸Na、亜硫酸水素Na、ゼラチンを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

**■お問い合わせ先**

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貴堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣 貴 堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）