

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

目薬

第3類医薬品

アイガンピンキー

情報化が進んだ現代では、生活をとりまくさまざまな場面で目を酷使しています。アイガンピンキーは、ビタミンB₁₂、ビタミンB₆、天然型ビタミンE等を配合した目薬で、「目の疲れ」や「目のかすみ」などの気になる症状に効果をあらわします。

使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人。
緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 目のかすみが改善されない場合。
 - 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

【用法・用量】

1日5～6回、1回2～3滴ずつ点眼してください。

（用法・用量に関連する注意）

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。容器の先が、まぶたやまつ毛に触れますと、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがありますので、注意してください。また、混濁したものは、使用しないでください。
- 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとってください。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用のみ使用してください。




裏面もよくお読みください。

【キャップの開閉方法】

キャップのあけ方

容器の側面をもち、キャップを上にし手前にひねってください。



キャップのしめ方

カチッと音がするまで押し下げてください。



容器の中心を押さえて開封すると薬液がとびだすことがあります。

【成分・分量】


100mL中

成分	分量
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg
イブシロン-アミノカブロン酸	1000mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	10mg
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	50mg
タウリン	1000mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg

添加物として、ホウ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na水和物、l-メントール、d-ボルネオール、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、pH調整剤を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(ビタミンB₁₂は光が当たると分解して退色します)
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。



■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）



製造販売元

株式会社 廣貫堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)